

1.3.1. Przeciwwskazania - kiedy nie przyjmować leku:

- ✓ jeśli masz uczulenie na jodek potasu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- ✓ jeśli masz nadczynność tarczycy,
- ✓ jeśli masz zaburzenie naczyń krwionośnych (zapalenie naczyń z hipokomplementemią),
- ✓ jeśli masz choroby autoimmunologiczne połączone ze świądem i pęcherzami na skórze (opryszczkowate zapalenie skóry Duhringa).

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- ✓ stosujesz lub stosowałeś w przeszłości leczenie chorób tarczycy,
- ✓ występuje nieleczona autonomia tarczycy,
- ✓ występuje zaburzenie czynności nerek,
- ✓ masz zaburzenia czynności nadnerczy i stosujesz leczenia z tym związane.

Pamiętaj! Przed przyjęciem leku zwróć się o poradę lekarza:

- ✓ w przypadku występowania złośliwego nowotworu tarczycy lub takiego podejrzenia,
- ✓ w przypadku zwężenia dróg oddechowych (powodującego trudności w oddychaniu).

Podanie leku preparatu ze stabilnym jodem może pogorszyć stan zdrowia jeśli:

- ✓ stosujesz lub stosowałeś w przeszłości leczenie chorób tarczycy,
- ✓ występuje nieleczona autonomia tarczycy,
- ✓ występuje zaburzenie czynności nerek,
- ✓ w przypadku zaburzenia czynności nadnerczy i leczenia z tym związanego.

JEŚLI WYSTĄPIĄ JAKIEKOLWIEK OBJAWY NIEPOŻĄDANE ORAZ W PRZYPADKU
JAKICHKOLWIEK
WATPLIWOŚCI SKONTAKTUJ SIĘ Z LEKARZEM LUB
FARMACEUTĄ !